

Limit skupiny XI, XJ Urológia, Gynekológia

XI

IMPLANTÁTY UROLOGICKÉ

XI

1.3.2 Suburetrálne plniace substancie ženské

INDIKÁCIE

1. zlyhanie predchádzajúcej chirurgickej liečby inkontinencie moču
2. plienkový test s únikom väčším ako 10 g
3. normálna uroflowmetrická krivka s maximálnym prietokom väčším ako 15 ml/s a reziduálnym močom menším ako 50 ml
4. zmiešaná inkontinencia moču s maximálnou cystometrickou kapacitou väčšou ako 350 ml, s normálnou poddajnosťou a stabilitou stený močového mechúra
5. tlakový bod úniku moču menší ako 100 cm H₂O

KONTRAINDIKÁCIE

1. čistá urgentná inkontinencia moču s urodynamickým dôkazom nestabilnej kontrakcie močového mechúra
2. zmiešaná inkontinencia moču s anamnesticky prítomnou prevahou urgentnej zložky alebo urodynamickým dôkazom nestabilného močového mechúra
3. neurogénny močový mechúr po cerebrálnej alebo spinálnej lézii traumatického pôvodu
4. neurogénny močový mechúr po cerebrálnej alebo spinálnej lézii inej ako traumatického pôvodu
5. strata kapacity a normálnej poddajnosti stený močového mechúra
6. subvezikálna obštrukcia
7. hematúria a recidivujúce infekcie močových ciest
8. fistuly močového mechúra s okolitými orgánmi

9. nádorové ochorenia močových ciest a genitálu, diseminované nádorové ochorenia

10. stavy po rádioterapii močového mechúra, uretry a genitálu

11. predpokladaná gravidita v budúcnosti, koagulopatie a závažné imunitné poruchy, alergie na aplikovanú látku